

پرندگان

آنفلوآنزای فوق حاد



روابط عمومی اداره کل دامپزشکی
استان البرز




آشنایی با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که آنفلوآنزای مرغی نیز نامیده می شود ، یک بیماری ویروسی بوده که از طریق پرندگان مهاجر و آزاد پرواز، انسان، وسایل نقلیه، باد و یا دیگر لوازم آلوده قابل انتقال می باشد . بیماری به شکلهای مختلف از مرگ و میر زیاد که هیچ علامتی به جز مرگ ناگهانی ندارد تا شکل بسیار خفیف یا حتی نا آشکار بروز می کند. این بیماری به عنوان یک بیماری مشترک انسان را نیز مبتلا می کند.

* آنفلوآنزای فوق حاد اغلب در مرغ و بوقلمون ظاهر می شود ، اردک و سایر پرندگان آبزی حتی نسبت به ویروس های بسیار بیماری زا مقاوم هستند.

* علایم بیماری در پرنده شامل بیحالی شدید سیاه شدن و خونریزی تاج، ریش و ساق پاست.






راههای انتقال بیماری در پرندگان

به طور کلی این بیماری غافلگیرکننده است چون زمان همه گیری آن غیر قابل پیش بینی است ، سرعت انتشار بیماری زیاد است ، درمانی برای پرندگان بیمار وجود ندارد و در صورت وقوع عواقب اقتصادی و اجتماعی گسترده ای در پی دارد. از طرفی انتشار سریع بیماری در گله به صورت تلفات ناگهانی ، زیاد و فزاینده (تا صد در صد) بدون بروز نشانه های دیگر است . پس توجه به راههای انتقال آن حیاتی است. به طور کلی منابع اصلی آلودگی شامل گونه های مختلف پرندگان اهلی ، پرندگان زینتی، پرندگان وحشی و سایر حیوانات هستند که در این بین پرندگان وحشی بویژه مرغان آبی مهاجر عمده ترین منبع آلودگی برای پرندگان اهلی به شمار می آیند.

پرندگان آلوده ویروس را همراه با ترشحات بینی ، چشم و مدفوع دفع می کنند.

ویروس به میزان زیاد از راه مدفوع دفع میشود و مدت قابل ملاحظه ای در آن به صورت حاد باقی می ماند.






راههای انتقال بیماری به انسان

- * تماس مستقیم با پرندگان زنده یا مرده آلوده
- * تماس با فرآورده های آلوده طیور مثل تخم مرغ
- * تماس غیر مستقیم از طریق استنشاق ویروس همراه با گرد و غبار آلوده به ویروس و یا تماس با سطوح و اشیاء آلوده به فضولات پرندگان آلوده

علائم آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در انسان

علائم آنفلوآنزای پرندگان در انسان تفاوتی با آنفلوآنزای معمولی ندارد. دوره کمون آن در انسان ۲ تا ۵ روز است. علائم اولیه شبیه آنفلوآنزای معمولی شامل تب بالا بیشتر از ۳۸ درجه، سردرد، خستگی، درد عضلانی، سرفه خشک، گلودرد، گرفتگی و آبریزش بینی است.

- * اسهال، تهوع، درد شکم و سینه و خونریزی از بینی و لثه
- * تنگی نفس که نشانه بدخیم شدن بیماری و ابتلای ریه ها است.



پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

* پرنده های خود را علیه بیماری های واگیردار پرندگان واکسینه نمایید.

* از نگهداری مرغ بومی در نزدیکی آبگیرها و دریاچه ها خودداری کنید.

* پرنده ها را در فضایی بسته نگهداری کنید.

* محل نگهداری پرنده ها را هرچندوقت یکبار ضدعفونی نمایید.

* از خرید پرنده زنده و پرندگان شکار شده از بازارهای محلی و فروشندگان دوره گرد جدا خودداری فرمایید.

* از ریختن لاشه ها در مسیر جاده ها و یا در محوطه های شهری و روستایی خودداری نمایید.

* از دست زدن به پرنده های بیمار و تلف شده خودداری نمایید.

* در صورت تماس دست یا دیگر قسمت های بدن با پرندگان تلف شده سریعاً نسبت به شست و شوی آن با آب و صابون و مواد ضدعفونی کننده اقدام نمایید.

* اگر پرنده بیمار یا تلف شده ای را دیدید به دامپزشکی اطلاع دهید.

* لاشه های تلف شده پرندگان را به صورت بهداشتی در محلی مناسب دفن نمایید.

آدرس : کرچ ، ابتدای جاده محمد شهر ، (روبروی ایستگاه

مترو محمد شهر

تلفن : ۲۷۵۲۲۳۷ - ۲۷۳۷۱۷۹

دور نگار : ۲۷۳۷۱۷۸

