

اداره کل دامپزشکی استان فارس



دستورالعمل بهداشتی

پیشگیری از بیماری

آنفلوآنزای پرندگان

مرغداریه‌های صنعتی



قابل توجه مرغداران محترم :

- ۱- قبل از جوجه ریزی نسبت به پاکسازی و ضدعفونی کامل فارم با دقت کامل اقدام گردد .
- ۲- ضمن مشورت با شبکه دامپزشکی منطقه نسبت به جوجه ریزی اقدام گردد .
- ۳- حتی المقدور قبل از ورود جوجه ، دان مورد نیاز را تامین نموده واز تهیه دان از منابع الوده منجمله سایر مرغدارها اکیدا " خودداری گردد.
- ۴- جوجه مورد نیاز از منابع مطمئن تهیه واز بدو ورود ،جوجه های وا زده از گله حذف گردد

"جوجه ها در روزهای اول و هفته اول نیاز به مراقبت بیشتری دارند"



۵- شرایط محیطی مناسب پرورش جوجه ها فراهم شود .

"تهویه نامناسب ، حرارت و رطوبت زیاد،زمینه ساز رشد اجرام بیماریزا است"

۶- کلیه سطوح سالن پرورش و نیز انبار دان اعم از کف ، سقف و دیوارهای داخلی و خارجی بایستی صیقلی و قابل شستشو و ضد عفونی باشد .

۷- از ورود پرندگان و جوندگان به داخل سالنها و انبار با ایجاد تمهیداتی از قبیل نصب توری جلوگیری گردد



۸- از ورود افراد متفرقه به مرغداری جلوگیری شود.

۹- در کلیه واحدهای پرورشی در صورت امکان نسبت به برقراری سیستم قرنطینه برای پرسنل اقدام شود و در صورت عدم امکان استفاده از دوش ، اطاق جداگانه جهت تعویض کامل لباس و کفش تعبیه شود.

۱۰- لباس، چکمه، کلاه و ماسک به تعداد کافی جهت بازدید کننده ها و واکسیناتور ها توسط مرغدار تهیه و در مرغداری نگهداری شود .

۱۱- برای هر سالن کارگر جداگانه در نظر گرفته شود و از تردد افراد بین سالنها بویژه در زمان وقوع تلفات جدا " جلوگیری شود.

۱۲- در ورودی مرغداری حوضچه ضد عفونی و دستگاه سمپاش ، جهت ضد عفونی خودروها و همچنین در ورودی سالن ها نیز حوضچه ضد عفونی و ظرف مخصوص جهت ضد عفونی دستها تعبیه گردد.

۱۳- عبور کلیه کامیونها پس از ورود از حوضچه ضد عفونی صورت گیرد به طور یکه چرخها و دیوارهای بیرونی کامیون هم ضد عفونی شود .

۱۳- از نگهداری گله در چند سن خودداری شود و فاصله مناسب بین دو جوجه ریزی رعایت گردد.

۱۴- در اولین فرصت نسبت به آزمایش میکربی آب مصرفی اقدام و سپس هر شش ماه یکبار تکرار نموده تا از سلامت آب اطمینان حاصل شود و در صورت آلوده بودن آب با مشورت کارشناس مربوطه رفع نقص شود

"ورود باکتریها از طریق آب یا هر عامل دیگر زمینه تکثیر ویروسها را فراهم می نماید"

۱۵- کلیه ورودیها و خروجها ثبت گردد تا امکان ردیابی عامل انتقال دهنده بیماری میسر گردد.

۱۶- کلیه اقدامات منجمله واکسیناسیون، نوع واکسن، شماره بچ واکسن و نام افراد واکسیناتور در دفتر ویژه ای ثبت شود.

۱۷- از وارد کردن استرس های بی مورد به گله از قبیل ورود افراد به شکل ناگهانی، ایجاد سروصدای ناهنجار، کاهش و یا افزایش غیر طبیعی دمای سالن، کاهش رطوبت شدید، قطع ناگهانی دان یا آب و قطع ناگهانی تهویه خودداری شود.

۱۸- نسبت به دفن بهداشتی تلفات یا سوزاندن لاشه ها با لاشه سوز اقدام واز خارج کردن لاشه طیور اکیدا " خودداری شود.

۱۹- هر نوع کاهش مصرف دان ، کاهش تولید ویا افزایش تلفات در اسرع وقت به اطلاع نزدیکترین شبکه دامپزشکی رسانده شود.

۲۰- مرغ کشتاری پایان دوره به نزدیکترین کشتارگاه داخل استان تحویل گردد و از فروش به مراکز عرضه مرغ زنده جدا " خودداری شود.

۲۱- کود سالن ها پس از اتمام دوره در محل مخصوص دیو شده و پس از کسب مجوز از شبکه دامپزشکی شهرستان نسبت به خروج آن از مرغداری اقدام گردد .

۲۲- در هنگام مراجعه کامیونهای حمل مرغ به مرغداری گواهی شستشو و ضد عفونی از کامیونهای مذکور اخذ و سپس اجازه ورود کامیون حمل مرغ به داخل مرغداری داده شود .

www.farsvet.ir

۰۷۱۱ - ۲۳۲۳۰۹۷

