

بیماری

تب حالت



روابط عمومی اداره کل دامپزشکی
استان البرز

بیماری بروسلوز (تب مالت، سقط واگیر، بیماری بانگ)

همیشه وقتی صحبت از شیر می‌شود همه به فواید آن فکر می‌کنند اما به راستی مگر شیر ضرر هم دارد؟ تب مالت یا هدیه شیرهای ناسالم از جمله از بیماری های عفونی است که در فصلهای گرم سال شیوعش وسیع است. بسیاری از خانواده‌ها گمان می‌کنند با وجود شیرهای پاستوریزه دیگر رد پای اینگونه بیماری ها بطور کامل از صفحه روزگار محو شده است اما باید این پیام را به خانواده‌ها داد و آن هم اینکه تا وقتی شیر هست تب مالت هم در کنارش است. بروسلوز یک بیماری عفونی واگیردار در گاو است که با سقط در مراحل آخر آبستنی و میزان بالای ناباروری خود را نشان می‌دهد. این بیماری بز، گوسفند، خوک و اسب را نیز درگیر می‌کند.



مصرف شیر خام و فراورده های لبنی آلوده ی غیر پاستوریزه و یا نجوشیده یک از راه های انتقال بیماری است.



علائم بیماری در زنان در خلال آبستنی ظاهر می شود.



درد کمر و درد در قسمت های پائینی پشت ... از نشانی های عمومی بروسلوز می باشد.

راه های انتقال بیماری



دام سالم می تواند از طریق غذا، مرتع، آب و شیر آلوده به میکروب، جنین سقط شده، پرده های جنینی و مایعات و ترشحات رحمی به تب مالت مبتلا شود. همچنین بیماری می تواند به وسیله سگ، موش، مگس، چکمه کارگران و گاری های حمل غذا، ماشین شیردوشی و سایر اسباب و لوازم دامپروری منتقل شود. گاهی میکروب تب مالت می تواند به ادرار نیز راه یابد.



علائم بالینی:

(۱) در گاو

- سقط در ۳-۴ ماه آخر آبستنی در ماده گاوهای آبستنی که واکسینه شده اند .
- التهاب و تورم بیضه
- تورم کیسه بیضه (یک یا هر دو کیسه)
- متورم بودن جنین وجفت
- تورم در زانو، مفصل رانی، مچ پا و قوزک و بین رباط پشت گردنی و اولین دنده سینه ای



مهم ترین علامت بیماری در دام ها، «سقط جنین» است.



عفونت در گاو در هر سنی می تواند رخ دهد ولی معمولا در دامی که از نظر جنسی بالغ شده است ؛ آلودگی ادامه پیدا می کند.



۲) درگوسفند

- تب، افزایش تعداد تنفس و بی حالی دام
- نامطلوب بودن کیفیت منی در قوچ ها
- تورم کیسه بیضه
- در مراحل که بیماری مزمن می شود بند بیضه سفت و متورم شده و بیضه ها تحلیل می روند و کوچک می شوند.
- ناباروری در قوچ ها و سقط در میش ها



راه های پیشگیری از بیماری

ارگانیسم های بروسلا فقط برای مدت کوتاهی می توانند در عضلات دام های کشتاری زنده بمانند. این ارگانیسم توسط اسید لاکتیک از بین می رود. کارکنانی که در تماس نزدیک با دام های آلوده هستند باید از دستکش استفاده کرده و مراقب ایجاد خراش های تصادفی در پوست باشند. در انسان بروسلاز را تب مالت (تب مالت)





استفاده از وسایلی نظیر دستکش و کلاه و ... در تماس با دام



پاستوریزه کردن لبنیات



رعایت بهداشت عمومی توسط افراد شاغل در کشتارگاه ها

می نامند. در صورتی که اقدامات بهداشتی و ضدعفونی های لازم صورت بگیرد، جمعیت مردمی از خطرات این بیماری در امان خواهند بود. شیر پاستوریزه شده عاری از بروسلوز است. همچنین در مناطق روستایی شیر خام بایستی قبل از مصرف به خوبی جوشانده شود. انسان های مبتلا از تب متناوب بالا، سردرد و کسالت رنج می برند. بروسلوز یک بیماری مشترک مهم بویژه در مناطق روستایی و کشورهای در حال توسعه است و یک خطر حرفه ای و شغلی مهم برای دامپزشکان، بازرسان دام و قصابها و کارگران می باشد. هیچگاه شیر غیر پاستوریزه، از هر منبعی که باشد، مصرف نکنید. زمانی که با حیوانات سر و کار دارید، از دستکش، محافظ چشم، پیش بند، و سایر وسایل محافظتی استفاده کنید. دامها را واکسینه کنید.



آدرس : کرج ، ابتدای جاده محمد شهر ، (روبروی ایستگاه
مترو محمد شهر

تلفن : ۲۷۵۲۲۳۷ - ۲۷۳۷۱۷۹

دور نگار : ۲۷۳۷۱۷۸

<http://Alborz.ivo.org.ir>